

Segretario regionale AIOP Associazione
Italiana
Via Timavo, 24
20124 MILANO (Mi)
Email: aioplombardia@cert.aconet.it

SEGRETARIO REGIONALE ANISAP
via Martiri delle Foibe 1
20900 MONZA ()
Email: amministrazione@anisap-lombardia.com

SEGRETARIO REGIONALE ARIS
Via Mantova, 113
26100 CREMONA (CR)
Email: arislombardia@arisassociazione.it

AI DIRETTORI GENERALI ATS
AI DIRETTORI GENERALI ASST
AI DIRETTORI GENERALI FONDAZIONI
IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO
AI LEGALI RAPPRESENTANTI IRCCS
PRIVATI - OSPEDALI CLASSIFICATI - CASA
DI CURA ACCREDITATE
AI SERVIZI FARMACEUTICI ASST, IRCCS E
STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

AI SERVIZI FARMACEUTICI ATS

Federazione Ordini dei Farmacisti della
Lombardia
Viale Piceno, 18
20129 MILANO (MI)
Email: ordinefarmacistimilomb@pec.fofi.it

FROMCeO LOMBARDIA Federazione
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della Lombardia
Via Massenzio Masia 30
22100 COMO (CO)
Email: presidenza.co@pec.omceo.it

e, p.c

ARIA SPA
Email: protocollo@pec.ariaspa.it

AIFA DIREZIONE GENERALE
Via del Tritone, 181
187 ROMA ()
Email: protocollo@pec.aifa.gov.it

Oggetto : Nota AIFA 51 - Precisazioni su durata Piano Terapeutico

Sono pervenute alla scrivente richieste in merito alla durata del Piano Terapeutico della nuova nota AIFA 51.

Considerate le diverse note regionali che si sono susseguite e che hanno prorogato la validità dei Piani terapeutici di farmaci e presidi, al fine di garantire la continuità terapeutica qualora il medico consideri stabilizzata la situazione dell'assistito e non sono insorti specifici sintomi che inducano ad una modifica della terapia, si precisa quanto segue.

Il trattamento con gli analoghi LHRH di cui alla nota AIFA 51, a seconda dell'indicazione terapeutica, può avere una durata che varia da un minimo di 1 mese ad un massimo di 24 mesi, pertanto si dispone che il clinico, al momento della redazione del PT, può indicare da un minimo di 1 mese di durata ad un massimo di 24 mesi, considerata la situazione clinica e la sicurezza per il paziente,

Si ricorda comunque che il trattamento prolungato con gli analoghi LHRH ha importanti effetti sul metabolismo osseo: Il marcato ipoestrogenismo tessutale indotto dalla terapia ormonale induce una importante accelerazione della perdita di massa ossea ed aumenta rapidamente il rischio fratturativo.

L'entità della perdita di osso dipende dalla potenza e dalla dose degli agonisti GnRH, dalla durata dell'utilizzo e infine dal grado di ipoestrogenismo che deriva dalla terapia.

E' inoltre necessario prestare attenzione all'utilizzo degli analoghi LHRH nelle pazienti giovani e adolescenti che potrebbero non aver ancora raggiunto il picco di massa ossea.

Distinti saluti

Il Dirigente

IDA FORTINO

ID ALLEGATO	NOME	FIRMATO	LINK
-------------	------	---------	------

Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO Tel. 02/6765.8042